

Lichen Sclerosus

Therapieplan / plan thérapeutique / piano terapeutico / therapy plan



1. Akut-Therapie / traitement d'attaque / terapia acuta / acute therapy

Clobetasolpropionate 0,5 mg/g (z.B. Dermovate[®] / Dermoxin[®] / Dermoval[®]) Cortisone Classe IV
oder/ou/o/or Mometason Fuorat (z.B. Elocom[®]), Bethametason (z.B. Diprosone[®]) Cortisone Classe III
or therapy 2nd line: non-steroidal medication, topical calcineurin inhibitors: e.g. Protopic[®] / Elidel[®]

12 Wochen/semaines/settimane/weeks 1 x täglich/par jour/al giorno/daily (total max. 25 – 30g in 12 Wochen)

+

fettende Salben / pommades émollientes / pomata oleosa / fat-based ointments

wenn keine Symptomatik
Plus de symptômes / senza disturbi
no symptoms

falls weiterhin Symptomatik
avec symptômes / disturbi persistenti
persisting symptoms

2. Erhaltungstherapie / traitement d'entretien/ terapia di mantenimento/ Maintenance therapy

Clobetasolpropionate 0,5 mg/g (z.B. Dermovate[®] / Dermoxin[®] / Dermoval[®]) Cortisone Classe IV
oder/ou/o/or Mometason Fuorat (z.B. Elocom[®]), Bethametason (z.B. Diprosone[®]) Cortisone Classe III
or therapy 2nd line: non-steroidal medication, topical calcineurin inhibitors: e.g. Protopic[®] / Elidel[®]

2 x pro Woche / par semaine/ per settimana / per week

+

fettende Salben / pommades émollientes / pomate oleose / fat-based ointments

Lichen Sclerosus - Therapy plan



1. Acute Therapy

**Clobetasolpropionate 0,5 mg/g (e.g. Dermovate[®] / Dermoxin[®] / Dermoval[®]) Cortisone Classe IV
or Mometason Fuorat (e.g. Elocom[®]), Bethametason (e.g. Diprosone[®]) Cortisone Classe III
or therapy 2nd line: non-steroidal medication, topical calcineurin inhibitors: e.g. Protopic[®] / Elidel[®]
12 weeks 1 x daily (total max. 25 – 30g over 12 weeks)**

+

fat-based ointments a few times a day

no symptoms

persisting symptoms

2. Maintenance therapy

**Clobetasolpropionate 0,5 mg/g (p.e. Dermovate[®] / Dermoxin[®] / Dermoval[®]) Cortisone Classe IV
or Mometason Fuorat (e.g. Elocom[®]), Bethametason (e.g. Diprosone[®]) Cortisone Classe III 2 x pro Woche per week
or therapy 2nd line: non-steroidal medication, topical calcineurin inhibitors: e.g. Protopic[®] / Elidel[®]**

+

fat-based ointments a few times a day



Lichen Sclerosus - Therapieplan



1. Akut-Therapie

**Clobetasolpropionate 0,5 mg/g (z.B. Dermovate[®] / Dermoxin[®] / Dermoval[®]) Cortisone Classe IV
oder Mometason Fuorat (z.B. Elocom[®]), Bethametason (z.B. Diprosone[®]) Cortisone Classe III
(oder 2nd line Therapie: nicht-steroidale Medikamente, topische Calcineurin-Inhibitoren: Protopic[®] / Elidel[®])
12 Wochen (total max. 25 – 30g in 12 Wochen)**

+

fettende Salben mehrmals täglich

wenn keine Symptomatik

falls weiterhin Symptomatik

2. Erhaltungstherapie

**Clobetasolpropionate 0,5 mg/g (z.B. Dermovate[®] / Dermoxin[®] / Dermoval[®]) Cortisone Classe IV
oder/ou/o/or Mometason Fuorat (z.B. Elocom[®]), Bethametason (z.B. Diprosone[®]) Cortisone Classe III
(oder 2nd line Therapie: nicht-steroidale Medikamente, topische Calcineurin-Inhibitoren: Protopic[®] / Elidel[®])**

2 x pro Woche (

+

fettende Salben mehrmals täglich



Lichen Sclerosus - piano terapeutico



1. Terapia acuta

Clobetasolpropionate 0,5 mg/g (p.e. Dermovate[®] / Dermoxin[®] / Dermoval[®]) Cortisone Classe IV

o Mometasone Fuorate (z.B. Elocom[®]), Bethametasone (z.B. Diprosone[®]) Cortisone Classe III

o therapy 2nd line: farmaco non steroideo, immunosoppressori/immunomodulatori > Inibitori della calcineurina: e.g. Protopic[®] / Elidel[®]

12 settimane 1 x al giorno (total max. 25 – 30g mentre 12 settimane)

+

pomata oleosa alcune volte al giorno

senza disturbi

disturbi persistenti

2. Terapia di mantenimento

Clobetasolpropionate 0,5 mg/g (p.e. Dermovate[®] / Dermoxin[®] / Dermoval[®]) Cortisone Classe IV

o Mometasone Fuorate (z.B. Elocom[®]), Bethametasone (z.B. Diprosone[®]) Cortisone Classe III

o therapy 2nd line: farmaco non steroideo, immunosoppressori/immunomodulatori > Inibitori della calcineurina: e.g. Protopic[®] / Elidel[®]

2 x per settimana

+

pomata oleosa alcune volte al giorno



Lichen scléreux - Plan thérapeutique



1. Traitement d'attaque

Propionate de clobétasol 0,5 mg/g (p.ex. Dermovate® / Dermoval®) Cortisone classe IV

OU furoate de mométasone (p.ex. Elocom®), Béthametasone (p.ex. Diprosone®) Cortisone classe III

ou traitement 2nd line: médication non stéroïdale / Immunosuppresseurs/immunomodulateurs > Inhibiteurs de la calcineurine p.ex. Protopic® / Elidel®

12 semaines 1 x par jour (total max. 25 – 30g sur 12 semaines)

+

Soins quotidiens avec pommades émollientes, onguents, huiles, plusieurs fois par jour

plus de symptômes

avec symptômes persistants

2. Thérapie d'entretien

Propionate de clobétasol 0,5 mg/g (p.ex. Dermovate® / Dermoval®) Cortisone classe IV

OU furoate de mométasone (p.ex. Elocom®), Béthametasone (p.ex. Diprosone®) Cortisone classe III

ou traitement de 2nd line: médication non stéroïdale / Immunosuppresseurs/immunomodulateurs > Inhibiteurs de la calcineurine p.ex. Protopic® / Elidel®

2 x par semaine

+

Soins quotidiens avec pommades émollientes, onguents, huiles, plusieurs fois par jour